

## KIEMKRACHTIGE ZADEN

Deze procedure vervangt de procedure CMA/2/II/A.10 van juli 2005.

### 1 TOEPASSINGSGBIED BODEMVERBETERENDE MIDDELEN EN GROEIMEDIA (OA. COMPOST )

500 ml vers analysemateriaal wordt gemengd met 2000 ml witveen, vochtig gemaakt en als een laag van 2 tot 3 cm in een platte schaal gebracht. Deze schaal wordt in een ruimte geplaatst waar de relatieve vochtigheid nagenoeg 100% bedraagt en bij een temperatuur van 21°C.

Gedurende 2 tot 3 weken wordt de opkomst van eventuele kiemkrachtige zaden gecontroleerd. Als controle wordt steeds witveen in deze test meegenomen.

### 2 TOEPASSINGSGBIED DIGESTAAT (CRITERIA DROGE STOFGEHALTE NORMAAL TUSSEN 6 EN 20 %)

Ten behoeve van het onderzoek op kiemkrachtige zaden wordt gebruik gemaakt van plastic bakken van ongeveer 20 op 50 cm (liefst voorzien van een passend deksel).

Op de bodem van de bak wordt een papier gespreid om een te snelle afvoer van het water te voorkomen.

Hierboven wordt een laag van ongeveer 5 cm grof zand gespreid.

Op de zandlaag wordt vervolgens 500 ml te onderzoeken vers digestaat aangebracht.

De schaal wordt in een ruimte geplaatst met een vrij constant klimaat bij een temperatuur van 21 °C en onder voldoende natuurlijk licht.

Gedurende de proef kan extra bevochtiging nodig zijn.

Gedurende 2 tot 3 weken wordt de opkomst van eventuele kiemkrachtige zaden gecontroleerd.

Bij elke monsterreeks wordt een blancobepaling uitgevoerd waarbij geen monster wordt gespreid op het zand.

### 3 REFERENTIES

- Praktijkonderzoek naar de landbouwkundige meerwaarde van vergiste mest boven onvergiste mest, M. Melai, T. Verstraten en P. van de Weijer, 's-Hertogenbosch, april 2004 ([www.novem.nl](http://www.novem.nl)).